


อะเบท® มีส่วนผสมของทีมีฟอส (temephos) เป็นสารกำจัดลูกน้ำยุงที่มีประสิทธิภาพสูง เป็นที่นิยมกันอย่างแพร่หลาย สามารถกำจัดลูกน้ำยุง ทั้งการสัมผัสหรือการกลืนกินเข้าไป และกำจัดลูกน้ำยุงได้ทุกระยะ ก่อนเข้าตัวแต่กำจัดได้ทั้งในน้ำที่สะอาด และน้ำที่สกปรก

ความเป็นพิษต่ำ

อะเบท® เป็นสารออร์กาโนฟอสเฟต ชนิดเดียวที่ผ่านการทดสอบโดยองค์การอนามัยโลก ว่าเป็นสารที่มีความเป็นพิษต่ำ ซึ่งไม่มีพิษต่อมนุษย์, นก, ปลา, สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมอื่นๆ และสิ่งมีชีวิตชนิดอื่นๆ ที่ไม่ใช่เป้าหมาย หากมีการใช้งานตามคำแนะนำบนฉลาก **อะเบท®** สารนี้มีความปลอดภัยต่อปลาและแหล่งน้ำ



อะเบท® 1% เอสจี สารป้องกันและกำจัดลูกน้ำยุง

อะเบท® เป็นสารกำจัดลูกน้ำยุงลาย ยุงก้นปล่อง ยุงรำคาญ ในแหล่งเพาะพันธุ์ยุงตามภาชนะเก็บน้ำ และท่อระบายน้ำภายในบ้านเรือนได้เป็นอย่างดี

อะเบท® ออกฤทธิ์ทำลายระบบประสาทการหายใจของลูกน้ำยุงลาย ยุงก้นปล่อง ยุงรำคาญ ทำให้ลูกน้ำยุงตายใน 1 ชั่วโมง และยังคงฤทธิ์อยู่ได้นานกว่า 3 เดือน

อะเบท® ยังสามารถใช้กำจัดตัวอ่อนของแมลงต่างๆ ได้ เช่น ไรน้ำจืด ไรน้ำเค็ม ไรดำ แมลงหวี่ขาว ฯลฯ

วิธีการใช้ อะเบท® 1% เอสจี กำจัดลูกน้ำยุง

1. ใส่ **อะเบท®** ในหนองน้ำทั่วไป ใช้อัตรา 200 กรัมต่อพื้นที่ผิวน้ำ 100 ตารางเมตร
2. ใส่ **อะเบท®** ในท่อระบายน้ำ ท้องร่อง ใช้อัตรา 200-300 กรัมต่อพื้นที่ผิวน้ำ 100 ตารางเมตร
3. ใส่ **อะเบท®** ในภาชนะบรรจุน้ำดื่ม น้ำใช้ ในอัตรา 1 กรัมต่อน้ำ 2 แกลลอน หรือ 2 ช้อนชาต่อน้ำ 140 ลิตร
ตุ่มมังกร (น้ำ 8-10 ปีบ) ใช้อัตรา 2 ช้อนชา
ตุ่มซิเมนต์ (น้ำ 12 ปีบ) ใช้อัตรา 2 ช้อนชาครึ่ง
ภายหลังการใช้ **อะเบท®** น้ำในภาชนะจะมีกลิ่นเล็กน้อย 1-2 วัน เพื่อลดกลิ่นให้เร็วขึ้น ควรเปิดภาชนะทิ้งไว้ 6-12 ชั่วโมง หรือเติมน้ำให้เต็ม
4. ใส่ **อะเบท®** ในเครื่องฟอกตู้กับข้าว แจกัน ใช้อัตรา 3-5 กรัม หรือ 1/10 ช้อนชา
5. เพื่อให้การกำจัดลูกน้ำยุงมีประสิทธิภาพสูงสุด ควรกำจัดตัวเต็มวัยของยุงควบคู่กันไป

คำเตือน

- ควรใช้ **อะเบท®** ตามอัตราใช้ที่กำหนดไว้ เพื่อไม่ให้เกิดอันตรายต่อคนและสัตว์เลี้ยง
- ก่อนใช้ **อะเบท®** ควรศึกษารายละเอียดและอ่านคำแนะนำวิธีการใช้บนฉลาก และปฏิบัติตามโดยเคร่งครัด

นำเข้าโดย : บริษัท บีเอเอสเอฟ (ไทย) จำกัด

ชั้น 23 อาคารเอ็มโพเรียม ทาวเวอร์ 622 ถนนสุขุมวิท 24 แขวงคลองตัน
เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110 โทร. 0 2624 1999

จำหน่ายโดย : บริษัท ที.เจ.ซี. เคมี จำกัด

518/5 อาคารมณีนยาเซ็นเตอร์ ชั้น 7 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี
เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 โทร. 0 2254 8301-7

ABATE® Larvicide

ปลอดภัยจากยุงลาย

กำจัดยุงร้าย
ต้องทำลายที่ต้นเหตุใช้
อะเบท® กำจัดลูกน้ำยุงลาย

ผู้แทนจำหน่าย :

BASF
We create chemistry

ไข้เลือดออก

(Dengue hemorrhagic fever)

มีสาเหตุมาจากเชื้อไวรัสเดงกี โดยมียุงลายเป็นพาหะนำโรค มักเกิดกับเด็กเล็กที่มีอายุต่ำกว่า 15 ปี โดยเฉพาะเด็กก่อนวัยเรียนและผู้สูงอายุ

อาการของไข้เลือดออก

ผู้ป่วยจะมีอาการดังต่อไปนี้

- มีไข้สูงติดต่อกันหลายวัน
- ปวดศีรษะ
- ปวดท้อง เจ็บลิ้นปี่ และเบื่ออาหาร
- เจ็บบริเวณชายโครงด้านขวา
- มีจุดเลือดเป็นผื่นแดงเล็กๆ ใต้ผิวหนัง
- อาเจียนเป็นเลือด
- ถ่ายเป็นเลือด

หากไม่รับน้ำส่งแพทย์หรือรักษาไม่ถูกวิธี ผู้ป่วยอาจเสียชีวิตได้



ยุงลาย พาหะนำโรคไข้เลือดออกและไข้ชิก้า

มีลักษณะเป็นยุงตัวเล็ก สีดำ มีลายขาวสลับดำ บริเวณลำตัว ส่วนขาและท้องแบ่งเป็นปล้องๆ ชอบหากินเวลากลางวัน ชอบอยู่ในที่มืด มักวางไข่ในภาชนะที่มีน้ำสะอาดจึงอยู่ ไข่ของยุงลายสามารถทนต่ออากาศแห้งได้ดี ใช้เวลาฟักเป็นลูกน้ำและลอกคราบเป็นตัวยุงประมาณ 8-12 วัน

ไข้ชิก้า (Zika fever)

เกิดจากการติดเชื้อไวรัสชิก้า ซึ่งอยู่ในตระกูลฟลาวิไวรัส มียุงลายเป็นพาหะนำโรค เช่นเดียวกับโรคไข้เลือดออก โรคไข้วัดข้อยุงลาย (ชิคุนกุนยา) และไข้เหลือง

สาเหตุหลักของการติดเชื้อ เกิดจากการโดนยุงลายที่มีเชื้อไวรัสชิก้ากัด และช่องทางอื่นๆที่อาจเป็นไปได้ เช่น การแพร่ผ่านทางเลือด การแพร่จากมารดาที่ป่วยสู่ทารกในครรภ์

อาการของไข้ชิก้า

ระยะฟักตัวของโรคไข้ชิก้าใช้เวลาเฉลี่ย 4-7 วันหลังโดนยุงกัด อาการที่พบบ่อย ได้แก่ มีไข้ มีผื่นแดง เยื่อบุตาอักเสบ ปวดกล้ามเนื้อ ปวดข้อ อ่อนเพลีย ปวดศีรษะ อาการเหล่านี้ไม่รุนแรง และเป็นอยู่ประมาณ 2-7 วัน

ยกเว้น ในหญิงตั้งครรภ์ อาจทำให้เด็กทารกที่คลอดมามีสมองเล็ก (microcephaly) หรือมีภาวะแทรกซ้อนระหว่างตั้งครรภ์ได้

ไข้เลือดออก ไข้ชิก้า โรคร้ายแรงจากยุงลาย

ยุงลายเป็นพาหะ ที่ทำให้เชื้อไวรัส สาเหตุไข้เลือดออก และไข้ชิก้า แพร่กระจายอย่างรวดเร็ว

วิธีป้องกันไข้เลือดออก และไข้ชิก้า คือ การป้องกันไม่ให้ยุงลายกัดและวางไข่ โดยการกำจัดลูกน้ำยุงลายตามแหล่งเพาะพันธุ์ต่างๆให้หมดไป แหล่งที่พบลูกน้ำยุงลายมาก ได้แก่ ตุ่มน้ำในบ้านและนอกบ้าน น้ำในที่รองขาตู้กับข้าว แจกัน จานรองกระถางต้นไม้ ภาชนะนอกบ้านที่มีน้ำฝนทิ้ง เช่น กระป๋อง โอ่ง อ่าง ไห ยางรถยนต์เก่า แจกันศาลพระภูมิ เป็นต้น

“ อย่่างไรก็ตาม ควรระวังบุตรหลานของท่านให้ปลอดภัยจาก ไข้เลือดออก และไข้ชิก้า ”

1. อย่าให้เด็กโดนยุงกัด ควรนั่งหรือนอนในที่สว่าง และกางมุ้งนอน
2. อย่าให้มีน้ำขังบริเวณบ้าน ควรทำลายภาชนะที่ไม่ใช้แล้ว เช่น ไห ชามแตก กระป๋อง ยางรถยนต์เก่า เป็นต้น
3. ปิดฝาตุ่มน้ำทุกครั้งภายหลังใช้เสร็จ
4. น้ำในภาชนะที่ใช้ควรเปลี่ยน ทุก 7 วัน



อะเบท® กำจัดลูกน้ำยุงลาย

“ กำจัดยุงลาย กำจัดไข้เลือดออก ไข้ชิก้า ”