



สละตอม®

เร็วกว่า ง่ายกว่า ประหยัดกว่า
สำหรับการกำจัดและควบคุมหนูในบ้านและหนูในฟาร์ม



- ◆ ประสิทธิภาพสารกำจัดหนู Flocoumafen กินเพียงครั้งเดียว
- ◆ รสชาติดี อดเป็นก้อน ทนทานต่อทุกสภาวะ
- ◆ รวดเร็ว ง่าย ปลอดภัยในการใช้
- ◆ คุ่มค่าสูงสุด เสียค่าใช้จ่ายน้อยสุด

Professional & Specialty Solutions

 **BASF**
We create chemistry

ประสิทธิภาพสูง แม้กินเพียงครั้งเดียว

สะตอม® ด้วยประสิทธิภาพของสาร Flocoumafen สามารถกำจัดหนูได้ทุกชนิด รวมทั้งหนูที่มีความต้านทาน ยาเบื่อหนูทั่วไป ใช้ปริมาณน้อยก็เห็นผล และสามารถฆ่าหนูที่กิน **สะตอม®** เพียงครั้งเดียว ได้ภายในเวลา 3-5 วัน หลังจากกินเหยื่อ ในขณะที่เหยื่อกำจัดหนูชนิดอื่น ต้องใช้เวลามากกว่าหนึ่งสัปดาห์ และยังไม่พบการต้านทาน สาร Flocoumafen ไม่ว่าจะเป็นหนูในบ้าน หรือหนูในฟาร์ม

มีรสชาติที่หนูชอบ และทนทานต่อทุกสภาวะ

สะตอม® ผลิตจากธัญพืชคุณภาพดี มีรสชาติที่หนูชอบ เหมาะกับหนูในบ้านและหนูในฟาร์ม โดยผสมผสาน กับไขมัน ช่วยให้ทนทานต่อความชื้น และทนต่อทุกสภาวะ


รวดเร็ว ง่าย ปลอดภัยในการใช้งาน

สะตอม® ถูกค้นคว้าวิจัยมาเพื่อให้ใช้งานได้ง่าย

และได้ผลเร็ว ในการทดสอบเพื่อเปรียบเทียบประสิทธิภาพของสะตอมกับยาเบื่อหนูชนิดอื่นๆ พบว่า **สะตอม®** สามารถกำจัดหนูได้สมบูรณ์แบบ โดยใช้เวลาน้อยที่สุด

คุ้มค่าสูงสุด เสียค่าใช้จ่ายน้อยสุด

สะตอม® หนูกินเพียงครั้งเดียว ทำให้หนูตายได้ ภายใน 3-5 วันหลังจากหนูกินเหยื่อ เป็นการใช้เหยื่อน้อยกว่า จึงทำให้ประหยัดต้นทุน และเวลาในการกำจัดหนู



การเปรียบเทียบประสิทธิภาพของยาเบื่อหนูชนิดต่างๆ			
ประเภทสารออกฤทธิ์ของยาเบื่อหนู	LD50	เหยื่อเข้มข้น กรัม/ก.ก.	ปริมาณเหยื่อ ที่เพียงพอต่อ LD50 ต่อหนูหนึ่งตัว หนัก 250 กรัม

สาร anticoagulant รุ่นแรก

Warfarin	186	0.25	186 กรัม
Coumatetralyl	16.5	0.37	11 กรัม

สาร anticoagulant รุ่นที่สอง

Bromadiolone	1.125	0.05	5.6 กรัม
Brodifacoum	0.4	0.05	2 กรัม
Flocoumafen (สะตอม®)	0.25	0.05	1.25 กรัม

*แหล่งข้อมูล: The Pesticide Manual, British Crop Protection Council, Twelfth Edition, 2000

การเปรียบเทียบผลการทดสอบของ สะตอม® กับยาเบื่อหนูชนิดอื่นๆ					
ประเภทสารออกฤทธิ์	ปริมาณเหยื่อที่ถูกกิน (กรัม)			อัตราการตาย %	ระยะเวลาเฉลี่ยที่เหยื่อตาย (วัน)
	สัปดาห์ที่ 1	สัปดาห์ที่ 2	สัปดาห์ที่ 3		

Bromadiolone	376.8	64.9	27.0	94.6	8.1
Brodifacoum	315.3	28.0	21.4	98.4	7.3
Flocoumafen (สะตอม®)	304.7	0.7	-	100	5.1

*แหล่งข้อมูล: Rowe F.P. et al, J Hyg., Camb. 1985, 95.

บริษัท บีเอเอสเอฟ (ไทย) จำกัด

ชั้น 23 อาคารเอ็มโพเรียมทาวเวอร์ 622 ถนนสุขุมวิท 24

เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110

www.pestcontrol.basf.com/asean

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 02-624-1999

เอกสารนี้ไม่ใช่ฉลาก ควรอ่านฉลากก่อนใช้ทุกครั้ง

BASF
We create chemistry